

NOMBRE:

Fecha Exp.:

Fecha Nto.:

## ⇒ Órganos Fonoarticulatorios

### LABIOS:

•En reposo:

- cerrados (con / sin tensión mlo.mentoniano)
- entreabiertos
- muy abiertos (se ven incisivos sup.)

•Ver:

- frenillos labiales
- labio fisurado
- cicatrices (loc. y ctas.)

•Forma:

- simétricos             normales
- asimétricos         finos
- corto (sup.)         gruesos
- inverso (sup. o inf.)

•Movilidad: ( N-normal Dif-con dif. Imp-impos.)

- lateralización
- proyección
- estiramiento
- vibración
- beso labios unidos

•Tonicidad: normotonía - hipertonía - hipotonía

### LENGUA:

•En reposo:

- apoyada en el paladar duro
- interpuesta entre las arcadas dentarias
- presionando lateralmente las arcadas
- posicionada hacia atrás

•Ver:

- frenillo lingual

•Forma:

- normal / escrotada / geográfica
- microglosia / estrecha / corta
- macroglosia / ancha
- con marcas laterales de dientes

•Movilidad: ( N-normal Dif-con dif. Imp-impos.)

- lateralización
- elevación
- proyección
- retroposición
- vibración
- afilar y ensanchar

•Tonicidad: normotonía - hipertonía - hipotonía

### DIENTES: (en oclusión)

- implantación dentaria correcta
- ausencia de piezas
- renovación dental \_\_\_\_\_
- línea media
- diastemas
- lleva PRÓTESIS /ORTODONCIA

•Maloclusión tipo \_\_\_\_\_ de Angle.

•Tipo de mordida

- normal
- abierta anterior
- cerrada anterior
- cruzada posterior

### MAX. SUP E INF:

•Perfil:

- retrusión maxilar
- retrusión mandibular
- proyección maxilar
- proyección mandibular

- simetría
- asimetría en ambos lados
- asimetría unilateral: rama más dlada:
  - mandibular dcha / izda
  - maxilar dcha / izda

### BUCCINAD:

- normales
- hipotónicos
- hipertónicos

### MASETER:

- normales
- hipotónicos
- hipertónicos

### MENTONIANO:

•En reposo:  retraído  tenso  relajado

•Al deglutir:  tenso  relajado

### PALADAR:

•En reposo:

- paladar normal     ancho
- ojival                 plano
- alto                   corto
- estrecho

•Ver:

- pliegues palatinos hipertróficos
- cicatrices o fistulas

### PALADAR BLANDO:

•En reposo:

- dimensión suficiente
- corto

•Ver:

- úvula bífida o surcada
- cicatrices o fistulas
- amígdalas hipertróficas

•Emisión /a/:

- buena movilidad
- incompetente

### A.T.M.

•Índice en CAE haciendo:

- apertura y cierre bucal
- proy. y retrop. mandibular
- lateralización mandibular

•Movilidad Mandibular:

- Correcta
- Incorrecta

•Constatar:

- crepitación
- resaltes
- hiperexcursión condílea
- hipoexcursión condílea
- apertura bucal aumentada
- apertura bucal disminuida
- síntomas dolorosos

## ⇒ Respiración

•Postura Corporal: forma de sentarse  erecta  otra:

•Cabeza en reposo:  alta  baja  horizontal

•Cuello en reposo:

•Tipo Respiratorio:  SUPERIOR  ABDOMINAL L  COSTO-DIAFR.

DIURNA:  nasal  bucal  mixta

NOCTURNA:  nasal  bucal  mixta

•Ritmo respiratorio:

profundo/superficial  lento / rápido  acalorado / errático

•Conducta Respiratoria:

- ascenso clavicular  contracción mtura. cuello
- labios entreabiertos en desconstracción

•Globo:  conseguido N°soplidos: \_\_\_\_\_  no conseguido

- lengua dentro del pitorro
- pérdida de aire: frontales ó laterales
- dientes mordiendo

•Insp. sostenida: \_\_\_\_\_ sg (ñ:13sg ; ad:22sg)

•Suficiencia Pulmonar: Respiración costal

INSPIRACIÓN: \_\_\_\_\_cm

ESPIRACIÓN: \_\_\_\_\_cm

•Soplo:  CANTIDAD ↑ = ↓

CONTROL ↑ = ↓

DIRECCIÓN ↑ = ↓

•Test de Rosenthal: (20 veces seguidas)

CONSEGUIDO  NO CONSEGUIDO

Izda.

Dcha

Ambas

•Espejo de Glatzel:

- igualados
- Mejor Izda / Dcha
- Obstrucción severa Izda / Dcha

•Tabla Dally=

(1/2 altura)+2= \_\_\_\_\_cm  
Perímetro Normalizado

•Tabla Baratoux=

inspir - espirac= \_\_\_\_\_cm  
Máx=6-9 cm Min=1-3 cm

⇒ Deglución

•Sin tocar al paciente mientras deglute:

- labios entreabiertos
- existe mímica perioral (aprieta labios; tensa mlo.mentoniano)
- mueve cabeza hacia delante

•Separando los labios en el momento de la deglución:

- interposición lingual entre arcadas dentarias
- presión lengua contra arcada superior
- presión lengua contra arcada inferior
- presión lingual lateral

⇒ Masticación

- boca abierta
- mastica sólo por un lado: Izdo. / Dcho.
- predomina lado Izdo. / Dcho.
- masticación anterior
- movs. exagerados lateralización
- movs. lengua hacia delante
- quedan restos en exceso en el vestíbulo bucal

⇒ Succión

- normal
- débil
- centrada
- lado: \_\_\_\_\_

⇒ Fonación

- acumula saliva en las comisuras / labios
- presencia de sigmatismo anterior o lateral
- escupe al hablar
- coordinación del habla y respiración
- incoordinación neumofonoarticularoria

•Timbre:

- normal
- fuerte o chillona
- débil
- ronca
- nasal
- velada o gutural
- entrecortada
- otra

•Intensidad: ↑ = ↓

•Tono: ↑ = ↓

⇒ Ritmo y Fluidez del Habla

•Ritmo:

- normal
- bradialia
- taquialia

•Fluidez:

- habla fluida
- habla NO fluida
- Grado de afectación L - M - G

•Disfluencias:

- repeticiones
- bloqueos
- prolongaciones
- muletillas

movs. asociados:

- tics: \_\_\_\_\_
- tensión muscular

•G Inteligibilidad habla: B - M- A

⇒ Discriminación Auditiva

•Discriminación de Sonidos: adivina qué oyes

- León
- Cristales rotos
- Claxon
- Ovejas
- Barco
- Perro
- Teléfono
- Gallina
- Bebé

•Discriminación de Sonidos: con instrumentos

- Campana - Tambor
- Tambor - Silbato
- Campana - Silbato

•Audición Fonémica: Luria Inicial (4-6 a) Test 7

Repite conmigo			1-0-?
be (b)	pe (p)	me (m)	
de (d)	ke (k)	ne (n)	
me-pe (m-p)		be-ne (b-n)	
pe-se (p-s)		te-ke (t-k)	
be-pe (b-p)		de-te (d-t)	
ke-gue (k-g)		re-le (r-l)	
b-p-b		p-b-p	
bi-ba-bo		bi-bo-ba	

Cuando diga...		1-0-?
B- levantas este brazo (brazo derecho) P- levantas éste (brazo izquierdo)		
-	P	
B	-	
B	-	
-	P	

Cuando diga...		1-0-?
B- levantas este brazo (brazo derecho) P- no hagas nada, no levantes ningún brazo		
B	-	
-	P	
-	P	
B	-	

Puntuación Total: \_\_\_\_\_  
(Test 7 Luria-máx 16)

⇒ Lateralidad

- Ojo:
- Pie:
- Mano: